

# MINI - CURSO

Métodos computacionais e inferência estatística

## **LEG: Laboratório de Estatística e Geoinformação/UFPR** **Equipe LEG :**

*Paulo Justiniano Ribeiro Jr*

*Wagner Hugo Bonat*

*Walmes Marques Zeviani*

*Elias Teixeira Krainski*

*Silvia Emiko Shimakura*

<http://www.leg.ufpr.br>  
{paulojus,wagner,walmes,elias,silvia}@leg.ufpr.br

DEX-UFLA

Lavras, MG, 01-03 de Fevereiro de 2012

# Tópicos

- Introdução
- Verossimilhança (1 parâmetro)
- Computação I
- Verossimilhança (2 ou mais parâmetros)
- Computação II
- Exemplos (seminários/conferências)
- Efeitos aleatórios
- Computação III
- Comentários adicionais/finais

# Motivação

- Público alvo: graduação a início de PG
- Experiências/exposição das gerações
- Facilidade de recursos computacionais e linguagens
- Uso de rotinas *versus* implementação/teste/ilustração/aprendizado
- Uso crítico e avaliação de limitações de rotinas

# Exemplo introdutório

Revisitando um exemplo simples:

- População:  $X \sim B(\theta)$
- Amostra:  $x_1, \dots, x_n$
- O que podemos falar sobre  $\theta$ ?
  - Qual a informação contida na amostra?
  - Consideram-se outras fontes de informação?
- informação na amostra resumida por  $(n, y = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n})$ ?

# Elementos

- função de verossimilhança  
probabilidade da amostra obtida para diferentes valores de  $\theta$
- **melhor** estimador
- conjunto de valores **razoavelmente compatíveis** com a amostra
- **decidir** entre dois valores o mais compatível com a amostra
- **decidir** se a amostra é compatível com certo valor  $\theta_0$  de interesse?
- **suposições/pressupostos**
- **relações** e **contrastes** com outros métodos

# Exercícios I

Obter (simular) uma amostra e obter o gráfico da função de verossimilhança (e/ou log-verossimilhança) para observações de:

- 1 distribuição Exponencial
- 2 distribuição Poisson
- 3 distribuição Normal com variância unitária  $N(\theta, 1)$
- 4 distribuição Normal com média zero  $N(0, \theta)$
- 5 distribuição Gamma com parâmetro de forma (*shape*) igual a 2
- 6 processo  $AR(1)$  de média zero e variância unitária
- 7 processo de Poisson homogêneo (1 dimensão) e não homogêneo com  $\lambda(t) = \theta t$

Modelos: (usando  $x = 1, 2, 3, \dots, 15$ )

8  $Y_i \sim N(\mu_i, 4)$  com  $\mu_i = \theta x_i$

9  $Y_i \sim B(p_i)$  com  $\log\{p_i/(1 - p_i)\} = \theta x_i$

10  $Y_i \sim P(\lambda_i)$  com  $\log(\lambda_i) = \theta x_i$

## Exercícios I (cont)

Para cada item anterior:

- escrever uma função de verossimilhança genérica (para qualquer amostra)
- verificar/comparar diferentes maneiras de escrever a função
- verificar se sua função está vetorizada para valores do parâmetro
- explorar as possibilidades de visualização do gráfico da função

## Sob o mesmo paradigma

- $Y_1, \dots, Y_n$  v.a. ;  $N(\theta, 1)$ 
  - melhor estimativa pontual, IC  $(\bar{y} \pm 1, 96/\sqrt{n})$ , interpretação do IC
- $Y_i = \alpha + \beta i + \epsilon_i$  com  $\epsilon_i \sim N(0, \sigma^2)$ 
  - inferências com múltiplos parâmetros  $(\alpha, \beta, \sigma^2)$
  - visualizações e parâmetros de interesse
- $Y \sim N(\mu, \sigma^2)$ 
  - $\theta = (\mu, \sigma^2)$
  - Interesse em inferências sobre funções dos parâmetros :

$$p = PY \geq u = 1 - \Phi\left(\frac{u - \mu}{\sigma}\right) = g_1(\theta)$$

$$u = \mu + \sigma\Phi^{-1}(1 - p_0) = g_2(\theta)$$

- $Y_i \sim N(\beta_0 + \sum_{j=1}^d \beta_j x_{ij}, \sigma^2)$ 
  - $x_{ij}$  valores das covariáveis,  $\theta = (\beta_0, \beta_1, \dots, \beta_d)$
  - interesse em efeito de um particular  $x_{ij}$ . Como avaliar se afetado pela demais covariáveis?

- outros modelos



# Definições

- $Y_1, \dots, Y_n$  v.a. **observáveis** com distribuição conjunta dependendo de parâmetros desconhecidos  $\theta = (\theta_1, \dots, \theta_d)$  com espaço paramétrico  $\Theta$
- Função de verossimilhança avaliada em (uma realização)  $y = y_1, \dots, y_n$
- $L(\theta; y) = f_Y(y; \theta)$  (contínua) ou  $L(\theta; y) = p(y; \theta)$  (discreta)
- Notação simplificada  $L(\theta)$  e  $l(\theta) = \log L(\theta)$   
 $L(\theta_1) > L(\theta_2) \iff l(\theta_1) > l(\theta_2)$

## Comentários:

- interpretação de  $L(\theta)$  ou  $l(\theta)$  :

Discreto: (log)probabilidade de observar  $x$  se  $\theta$  é o parâmetro verdadeiro

Contínuo: (log)  $\lim_{\delta x \rightarrow 0} \frac{P\{x_i \leq X_i < x_i + \delta_i, i=1, \dots, n; \theta\}}{\delta x_1 \dots \delta x_n}$

- verossimilhança relativa  $L(\theta_1)/L(\theta_2)$  (ou  $\log \{L(\theta_1)/L(\theta_2)\} = l(\theta_1) - l(\theta_2)$ )

- observações i.i.d.  $L(\theta) = \prod_{i=1}^n f(y_i; \theta) \quad \theta \in \Theta$  (univariadas)

- observações independentes  $L(\theta) = \prod_{i=1}^n f_{Y_i}(y_i; \theta) \quad \theta \in \Theta$  (univariadas)

- observações bloco independentes  $L(\theta) = \prod_{i=1}^K f_{Y_k}(y_k; \theta) \quad \theta \in \Theta$  (multivariadas)

## EMV (MLE)

$\hat{\theta}$  EMV de  $\theta$  satisfaz:

$$L(\hat{\theta}) = \sup_{\theta \in \Theta} \{L(\theta)\} \text{ ou } l(\hat{\theta}) = \sup_{\theta \in \Theta} \{l(\theta)\}$$

Estritamente é um supremo e não um máximo

Definições complementares:

- Função escore  $U(\theta) = l'(\theta)$
- Hessiano  $H(\theta) = U'(\theta) = l''(\theta)$

Sob certas condições de regularidade  $\hat{\theta}$  EMV de  $\theta$  satisfaz:

$$U(\theta) = 0 \text{ (equação de estimação)}$$

## Obtendo estimativas (EMV)

- Solução analítica:  
estudando comportamento de  $l(\theta)$  ou resolvendo  $U(\theta) = 0$
- Métodos/aproximações numéricas
  - Solução da(s) equação(ões) de estimação (função escore)
    - com uso de derivadas (Newton-Raphson)
    - sem uso de derivadas
  - Maximização da função de (log)-verossimilhança
- Diversidade de algoritmos de maximização
- (re)parametrizações

## Exercício I (cont)

Para cada item do [Exercício](#) obter (quando possível)

- $U(\theta)$  e seu gráfico
- $H(\theta)$
- EMV analítico
- EMV via Newton-Raphson
- EMV via solução de equação de estimação
- EMV via maximização da função de verossimilhança

## Exemplo: Exponencial (i.i.d.)

$$f(y_i, \theta) = \theta \exp\{-\theta y_i\} \quad y > 0; \theta > 0$$

$$F(y_i, \theta) = 1 - \exp\{-\theta y_i\} \quad y > 0; \theta > 0$$

$$L(\theta) = \theta^n \exp\{-\theta n\bar{y}\}$$

$$l(\theta) = n \log(\theta) - \theta n\bar{y}$$

$$U(\theta) = \frac{n}{\theta} - n\bar{y}$$

$$H(\theta) = -\frac{n}{\theta^2} \quad (\text{depende do valor de } \theta!!)$$

$$\hat{\theta} = 1/\bar{y}$$

**Código R**

## EMV de funções do parâmetro

### EMV de funções (1-1) do parâmetro

$$\phi_1 = g_1(\theta) = 1/\theta \longrightarrow \hat{\phi}_1 = 1/\hat{\theta} = \bar{y}$$

$$\phi_2 = g_2(\theta) = \log(\theta) \longrightarrow \hat{\phi}_2 = \log(\hat{\theta}) = \log(\bar{y})$$

$$\phi_3 = g_3(\theta) = P[Y > u] = 1 - F(u; \theta) = \exp\{-\theta u\} \longrightarrow \hat{\phi}_3 = \exp\{-\hat{\theta} u\} = \exp\{-\bar{y} u\}$$

$$\phi_4 = g_4(\theta) = md = F^{-1}(0,5) = -\frac{\log(0,5)}{\theta} \longrightarrow \hat{\phi}_4 = -\frac{\log(0,5)}{\hat{\theta}} = -\log(0,5)\bar{y}$$

$$\phi_5 = g_5(\theta) = md = F^{-1}(0,5) = -\frac{\log(0,5)}{\theta} \longrightarrow \hat{\phi}_5 = -\frac{\log(0,5)}{\hat{\theta}} = -\log(0,5)\bar{y}$$

## Função deviance

Uma representação alternativa (e **conveniente**) da função de verossimilhança

$$D(\theta) = 2 [ l(\hat{\theta}) - l(\theta) ]$$

- chamada de função deviance
- interpretação como (log de) verossimilhança relativa
- (ver gráfico)
- características da representação gráfica
- localização do EMV (raiz)



## Exercício (cont)

- Traçar a função deviance para cada caso do Exercício I
- No exemplo da exponencial:
  - traçar a função de (log)verossimilhança e deviance para  $\phi_1$  e  $\phi_4$
  - calcular  $l(\hat{\phi}_1), l(\hat{\phi}_2), l(\hat{\phi}_3), l(\hat{\phi}_4)$  e comparar com  $l(\theta)$
  - ajustar os valores dos eixos das abcissas "adequadamente"
  - discutir os resultados

# Estimação intervalar

Definição "natural": valores com compatibilidade **aceitável** com amostra

Intervalo ou região de confiança para  $\theta$  é um conjunto de valores que satisfaz uma das seguintes condições (equivalentes)

- $\{\theta \in \Theta | 0 \leq \frac{L(\theta)}{L(\hat{\theta})} \leq c_L\} \quad 0 < c_L \leq 1$
- $\{\theta \in \Theta | 0 \leq l(\hat{\theta}) - l(\theta) \leq c_l\} \quad c_l \geq 0$
- $\{\theta \in \Theta | 0 \leq D(\theta) \leq c_D\} \quad c_l \geq 0$

|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| $c_L \rightarrow c_l \rightarrow c_D$ | $c_L \leftarrow c_l \leftarrow c_D$ |
| $c_l = -\log(c_L)$                    | $c_l = c_D/2$                       |
| $c_D = 2c_l = -2\log(c_L)$            | $c_L = \exp(-c_D/2)$                |

## Exercício (cont)

Considere as verossimilhanças relativas de 50, 26, 15 e 3,6%  
(i.e.  $c_L = 0,5; 0,15$  e  $0,04$ )

- encontrar os valores de  $c_I$  e  $c_D$
- encontrar os limites dos intervalos para cada um desses valores e adicionar aos gráficos
  - das funções de log-verossimilhança e deviance para cada caso do Exercício I
  - das funções de log-verossimilhança e deviance para cada (re)parametrização da exponencial
- calcular  $\sqrt{c_D}$  e  $P[|Z| < \sqrt{c_D}]$  ( $Z \sim N(0, 1)$ )

Resposta parcial:

| $c_L$ | $c_I$ | $c_D$ | $P[ Z  < \sqrt{c_D}]$ |
|-------|-------|-------|-----------------------|
| 50%   | 0,693 | 1,386 | 0,761                 |
| 26%   | 1,661 | 3,321 | 0,899                 |
| 15%   | 1,897 | 3,794 | 0,942                 |
| 3,6%  | 3,324 | 6,648 | 0,990                 |

## Dificuldades

### Funções típicas e atípicas (gráficos)

- não concava
- limites do espaço paramétrico dependente de parâmetro
- borda de espaços paramétricos
- intervalos disjuntos

# Exemplo A

$$Y \sim N(\theta, 1) \quad \Theta = (-\infty, \infty)$$

$$l(\theta) = C - \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n (y_i - \theta)^2$$

$$U(\theta) = \sum_{i=1}^n (y_i - \theta)$$

$$H(\theta) = -n$$

$$U(\theta) = 0 \longrightarrow \hat{\theta} = \bar{y}$$

$$D(\theta) = \dots = n(\bar{y} - \theta)$$

$$D(\theta) = c_D \longrightarrow (\hat{\theta}_I, \hat{\theta}_S) = (\bar{y} - \sqrt{c_D/n}, \bar{y} + \sqrt{c_D/n})$$

## Aspectos relevantes

- exatamente quadrática (simétrica)
- côncava, espaço paramétrico  $\Theta$  não depende de  $\theta$ ,  $\hat{\theta}$  é interior a  $\Theta$
- **completamente** determinada por  $\hat{\theta}$ ,  $l(\hat{\theta})$  e  $H(\hat{\theta})$
- comprimento dos IC's independe dos dados (o comprimento mesmo para diferentes experimentos)
- $\bar{y} \sim N(0, 1/n) \rightarrow \sqrt{n}(\bar{y} - \theta) \sim N(0, 1) \rightarrow n(\bar{y} - \theta) = D(\theta) \sim \chi_1^2$
- Pode-se calcular  $P[D(\theta) \leq c_d]$  ou ...
- Pode-se encontrar  $c_D$  tal que  $P[D(\theta) \leq c_d] = 1 - \alpha$
- **IC probabilístico**

| Confiança | $c_D$ | $\sqrt{c_D}$ | $c_L$  |
|-----------|-------|--------------|--------|
| 90%       | 2,71  | 1,645        | 25,8%  |
| 95%       | 3,84  | 1,960        | 14,77% |
| 99%       | 6,63  | 2,576        | 3,6%   |

## Exemplo B

$$Y \sim U(0, \theta)$$

$$l(\theta) = \theta^{-n} \text{ (gráfico)}$$

$$U(\theta) = -n\theta^{-(n-1)}$$

$$H(\theta) = n(n-1)\theta^{-(n-1)}$$

$$D(\theta) = \dots = 2n[\log(\theta) - \log(\hat{\theta})]$$

$$D(\theta) = c_D \longrightarrow (\hat{\theta}_I, \hat{\theta}_S) = (\hat{\theta}, \hat{\theta} \exp\{c_D/2n\})$$

## Aspectos relevantes

- não quadrática, assimétrica e não se torna quadrática com  $n \rightarrow \infty$

- $U(\theta) = 0$  não produz  $\hat{\theta}$

- EMV é óbvio pelo gráfico e/ou

$$L(\theta) = \theta^{-n} \prod_{i=1}^n I_{[0, \theta]}(y_i) \longrightarrow L(\theta) = \theta^{-n} I_{[0, \theta]}(\max\{y_1, \dots, y_n\})$$

- $\Theta = (\max\{y_1, \dots, y_n\}, \infty)$

- informação desigual os redor do EMV:  
esquerda:  $\hat{\theta}$  deve ser maior que  $\max\{y_1, \dots, y_n\}$   
direita: pouca informação

- verossimilhança só depende de  $(n, \max\{y_1, \dots, y_n\})$

- domínio da v.a. depende do parâmetro

- $D(\theta) \neq \chi^2$



## Exemplo C

$$Y \sim \text{Exp}(\theta)$$

$$l(\theta) = n \log(\theta) - \theta n \bar{y}$$

$$U(\theta) = \frac{n}{\theta} - n \bar{y}$$

$$H(\theta) = -\frac{n}{\theta^2}$$

$$\frac{d^i}{d\theta^i} = (-1)^{i+1} (i-1)! n \theta^{-i}$$

$$U(\theta) = 0 \longrightarrow \hat{\theta} = 1/\bar{y}$$

$$D(\theta) = \dots = 2n[\log(\hat{\theta}/\theta) + \bar{y}(\theta - \hat{\theta})]$$

## Aspectos relevantes

- assimétrica, concava, polinomial de ordem infinita
- mas aproxima-se de simétrico com  $n \rightarrow \infty$
- $H(\theta)$  depende do valor de  $\theta$
- IC resolvendo  $D(\theta) = c_d$ 
  - "exata" por métodos numéricos
  - aproximação por Taylor

$$D(\theta) \approx \tilde{D}(\theta) = \dots = n \left( \frac{\theta - \hat{\theta}}{\hat{\theta}} \right)^2$$

$$\tilde{D}(\theta) = c_D \rightarrow (\hat{\theta}_I, \hat{\theta}_S) = (\hat{\theta}(1 - \sqrt{c_D/n}), \hat{\theta}(1 + \sqrt{c_D/n}))$$

- $D(\theta) \approx \chi_1^2$
- Intuição: por que  $I(\theta)$  é assimétrica ao redor de  $\hat{\theta}$  para  $n$  pequeno?

## Exemplo C - Complementos/Exercícios

- Ilustrar que o comportamento de  $l(\theta)$  com valores crescentes do tamanho de amostra, por exemplo  $n = (10, 25, 100)$
- Deduzir as expressões de  $D(\theta)$ ,  $\tilde{D}(\theta)$  e  $(\hat{\theta}_I, \hat{\theta}_S)$
- Escrever algoritmo que retorne: EMV pontual e intervalares (por métodos numéricos e aproximação quadrática)
- Programar e executar rotinas para um estudo de simulação para verificar a taxa de cobertura dos dois IC's (numérico e aproximação quadrática) para os diferentes tamanhos de amostra

## Outros exemplos (iid)

- Dados arredondados e modelos contínuos para observações discretas  
Exemplo para observações inteiras:

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n \{F_Y(y_i + 1/2) - F_Y(y_i - 1/2)\} = \prod_{i=1}^n \int_{y_i - 1/2}^{y_i + 1/2} f_Y(y_i; \theta) dy_i \approx \prod_{i=1}^n f_Y(y_i) \times 1$$

Aproximação só é boa se  $f_Y(y)$  é relativamente constante no intervalo

- Dados censurados (direita, esquerda, intervalar)

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n f_Y(y_i, \theta)^{\delta_i} (P[L_I < Y_i < L_S])^{1-\delta_i}$$

$\delta_i$  é variável indicadora de censura  
( $L_I, L_S$ ) são os limites dos intervalos das observações

# Invariância

- Interesse em **inferências sobre  $g(\theta)$**
- $g(\theta)$  função 1-1 (bijetora)
- Exemplos:  $\phi_1, \phi_2, \phi_3, \phi_4, \phi_5$  (do exemplo da exponencial)
- Intuição:  $L(\phi) = L(g(\theta))$   
deformação do eixo das abcissas sem alterar ordenadas
- $\hat{\phi} = g(\theta), \hat{\phi}_I = g(\theta_I), \hat{\phi}_S = g(\theta_S)$
- Importância da invariância
  - apenas uma maximização (métodos numéricos) necessária para EMV e IC
  - $L(\cdot)$  pode ser quadrática em uma parametrização e altamente não quadrática em outra
  - sugere escolha de **parametrização mais adequada**

## Exercícios

Para o exemplo da distribuição exponencial com

$$\phi_1 = g_1(\theta) = 1/\theta$$

$$\phi_2 = g_2(\theta) = \log(\theta)$$

$$\phi_3 = g_3(\theta) = P[Y > u] = 1 - F(u; \theta) = \exp\{-\theta u\}$$

$$\phi_4 = g_4(\theta) = md = F^{-1}(0,5) = -\log(0,5)/\theta$$

$$\phi_5 = g_5(\theta) = q_{0,90} = F^{-1}(0,90) = -\log(0,90)/\theta$$

- traçar a função de log-verossimilhança para  $\phi_1, \phi_2, \phi_3, \phi_4, \phi_5$
- calcular  $l(\hat{\phi}_1), l(\hat{\phi}_2), l(\hat{\phi}_3), l(\hat{\phi}_4), l(\hat{\phi}_5)$  e comparar com  $l(\theta)$
- ajustar os valores dos eixos das abcissas "adequadamente"
- em cada caso encontrar os valores do parâmetro que correspondem a 20% do valor maximizado da verossimilhança
- discutir os resultados

● traçar as funções deviance

● refletir sobre como escrever funções R que sejam genéricas

## Aproximações assintóticas

- Avaliar efeito da amostra no IC pode ser não trivial mesmo para exemplos simples
- Escolha (probabilística) de  $c_D$
- Avaliar comportamento de  $L(\theta)$  quando  $n \rightarrow \infty$
- Aproximações por série de Taylor ao redor de  $\hat{\theta}$

$$l(\theta) = l(\hat{\theta} + (\theta - \hat{\theta}))l'(\hat{\theta}) + \frac{1}{2}(\theta - \hat{\theta})^2 l''(\theta^*) \text{ para } |\theta^* - \theta| \leq |\hat{\theta} - \theta|$$

$$l'(\theta) = l'(\hat{\theta} + (\theta - \hat{\theta}))l''(\theta^+) \text{ para } |\theta^+ - \theta| \leq |\hat{\theta} - \theta|$$

- Função Escore:  $U(\theta) = l'(\theta)$
- Informação observada:  $l_O(\theta) = -H(\theta) = l''(\theta)$
- Informação esperada:  $l_E(\theta) = E_Y[l_O(\theta)] = E_Y \left\{ \frac{d^2 \log L(\theta; Y)}{d\theta^2} \right\}$

- $(\log)$  verossimilhança é **função aleatória**, v.a. determina  $\hat{\theta}$ ,  $U(\theta)$  e  $l_O(\theta)$

## Propriedades amostrais

Propriedades amostrais ( substituindo  $y$  por  $Y$  )

- D1:  $E(T) = g(\theta)$  :  $T = T(Y)$  é estimador não viesado de  $g(\theta)$
- L1:  $E[U(\theta)] = 0$  e  $\text{Var}[U(\theta)] = I_E(\theta)$
- L2:  $E(T) = \theta \rightarrow \text{Var}[T] \geq [I_E(\theta)]^{-1}$  (limite inferior de Cramér-Rao)
- L3:  $E(T) = g(\theta) \rightarrow \text{Var}[T] \geq [g'(\theta)]^2 [I_E(\theta)]^{-1}$

Sob **condições de regularidade**

- $\Theta$  é finito dimensional e  $\theta$  é interior a  $\Theta$
- primeiras três derivadas de  $l(\theta)$  na vizinhança de  $\theta$
- amplitude não depende de  $\theta$
- $l(\theta) \approx$  quadrática para  $n \rightarrow \infty$ , passando a depender apenas da posição e curvatura no EMV



# Resultados

Para problemas regulares com  $n \rightarrow \infty$ :

- T1:  $\sqrt{I_E(\theta)}(\hat{\theta} - \theta) \sim N(0, 1)$  ou  $\hat{\theta} \sim N(\theta, [I_E(\theta)]^{-1})$   
(distribuição assintótica do EMV)  
Elementos: aproximação quadrática,  $I_O \rightarrow I_E$  e TLC
- C1:  $\hat{\phi} = g(\hat{\theta}) \sim N(\phi, [g'(\theta)]^2 [I_E(\theta)]^{-1})$   
Método delta:  $\text{Var}(\hat{\phi}) = [g'(\theta)]^2 [I_E(\theta)]^{-1}$

$$se(\hat{\phi}) = |g'(\theta)| [I_E(\theta)]^{-1/2}$$

- C2: Equivalência assintótica e **conveniência** ( $\neq$ 's convergências)

$$\sqrt{I_O(\hat{\theta})}(\hat{\theta} - \theta) \approx \sqrt{I_O(\theta)}(\hat{\theta} - \theta) \approx \sqrt{I_E(\hat{\theta})}(\hat{\theta} - \theta) \approx \sqrt{I_E(\theta)}(\hat{\theta} - \theta) \sim N(0, 1)$$

- T2:  $D(\theta) = 2[l(\hat{\theta}) - l(\theta)] \sim \chi_1^2$  (pela aproximação)

## Discussão

- EMV  $\hat{\theta}$  assintoticamente:  
não viciado, atinge limite inferior de Cramér-Rao com **erro padrão**  
 $se(\hat{\theta}) = [I_E(\theta)]^{-1/2}$   
e intervalos de confiança (probabilísticos)  $(1 - \alpha)$  da forma  $\hat{\theta} \pm z_{\alpha/2} se(\hat{\theta})$
- EMV  $\hat{\phi} = \hat{\theta}$  assintoticamente:  
não viciado, atinge limite inferior de Cramér-Rao com **erro padrão**  
 $se(\hat{\phi}) = \sqrt{[g'(\theta)]^2 [I_E(\theta)]^{-1}}$   
e intervalos de confiança (probabilísticos)  $(1 - \alpha)$  da forma  
 $g(\hat{\theta}) \pm z_{\alpha/2} se(\hat{\phi}) = g(\hat{\theta}) \pm z_{\alpha/2} |g'(\theta)| [I_E(\theta)]^{-1/2}$
- $I_E(\theta)$  pode ser substituído por  $I_E(\hat{\theta})$ ,  $I_O(\theta)$  ou  $I_O(\hat{\theta})$  e  $g'(\theta)$  por  $g'(\hat{\theta})$
- $I_O(\hat{\theta})$ : fácil obtenção, obtenção por métodos numéricos e **boas propriedades** (intuição!)
- IC  $(\hat{\theta}_I, \hat{\theta}_S)$  mais razoável é obtido por:  $\{\theta \in \Theta : D(\theta) \leq c_D\}$

- IC  $(\hat{\phi}_I, \hat{\phi}_S) = (g(\hat{\theta}_I), g(\hat{\theta}_S))$
- Se transformação  $g(\cdot)$  é não linear, invariância **não é válida** para aproximação quadrática

$$\{g(\hat{\theta}_I), g(\hat{\theta}_S)\} = \{g(\hat{\theta} - z_{\alpha/2}[I_E(\hat{\theta})]^{-1/2}), g(\hat{\theta} + z_{\alpha/2}[I_E(\hat{\theta})]^{-1/2})\} \neq \\ (\tilde{\phi}_I, \tilde{\phi}_S) = \{g(\hat{\theta}) - z_{\alpha/2}|g'(\theta)|[I_E(\hat{\theta})]^{-1/2}, g(\hat{\theta}) + z_{\alpha/2}|g'(\theta)|[I_E(\hat{\theta})]^{-1/2}\}$$

- $l(\phi)$  é menos assimétrica:  $(\tilde{\phi}_I, \tilde{\phi}_S)$   
 $l(\theta)$  é menos assimétrica:  $(g(\tilde{\phi}_I), g(\tilde{\phi}_S))$

- **Recomendações:**

**Melhor abordagem:** (mais geral e acurácia)

IC's baseados verossimilhança/deviance (muitas vezes só obtidos numericamente) **Intervalos assintóticos** (utilizam  $se(\hat{\theta})$ , obtenção a partir da aproximação quadrática, formas fechadas )

Escolher parametrização da função que forneça uma boa aproximação quadrática

IC's para funções dos parâmetros: obtenção pelo método delta ou direta se aproximadamente quadrática